

DEXYANE MeD

Pomirjajoča obnovitvena krema Obraz, telo in roke
Dojenčki od 3. meseca starosti - otroci - odrasli

Kaj vsebuje DEXYANE MeD krema?

WATER (AQUA), GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BUTYLENE GLYCOL, POLYSORBATE 60, GLYCERYL STEARATE, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, BEESWAX, PEG-100 STEARATE, 10-HYDROXYDECENOIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, CETYL ALCOHOL, CITRIC ACID, GLYCERYRHETINIC ACID, GUANIDINE CARBONATE, POLYACRYLATE-13, POLYSOBUTENE, POLYSORBATE 20, SCLEROTIUM GUM, SORBITAN ISOSTEARATE

V katerih primerih se uporablja DEXYANE MeD krema?

Ta pomirjajoča obnovitvena krema je primerna za zdravljenje ekcemov, vključno z atopijskim ekcemom, kontaktnim ekcemom in kroničnimi ekcemi. Ekcem je povezan z oslabljeno pregrado funkcijo kože, kar povzroči večje tveganje za reakcijo kože (suha koža, razdraženost, srbenje) na alergene in druge dražljive dejavnike.

Kako DEXYANE MeD krema deluje?

1. Obnavlja poškodovano vrhno plast kože in odpravlja suhost zahvaljujoč kombinaciji glicerola, karilejevega masla in trigliceridov.
2. Pomirja občutek srbenja in bolečine ter zmanjšuje intenzivnost vnetja (rdečina in razdraženost).
3. Ščiti kožo zahvaljujoč polprepustnemu filmu, ki ga ustvari galenska formula, obogatena z naravnimi polisaharidi.
4. Zmanjšuje adhezijo bakterij (S. aureus, potencialno vpletene v nastanek superinfekcij na poškodovani koži).

Klinično dokazano delovanje: DEXYANE MeD krema pomaga odpravljati ekceme in preprečevati njihov ponovni nastanek.

- Samostojno kot prva izbira za zdravljenje lažjih oblik vnetih lezij: zdravi lezije in pomirja bolečino

- V kombinaciji z dermalnim kortikosteroidom za topikalno uporabo za zmerne do težje oblike vnetih lezij: izboljša njegovo učinkovitost in tako pacientu omogoča hitrejšo olajšanje, že po 3 dneh.

- Po zdravljenju z dermalnim kortikosteroidom, zmanjšuje ponovitev nastanek lezij in pomiri bolečino.

Krema ne povzroča občutka lepljivosti in je mazljiva, kar zagotavlja dobro compliance. Prizadeti koži povrne voljnost in občutek ugodja.

Klinično testirana toleranca. Ne vsebuje kortizona in dišav. Testirano na nikelj.

Kako uporabljati DEXYANE MeD kremo?

Nanesite direktno na vnetni ekcem. Lahko uporabljate samostojno ali v kombinaciji z dermalnim kortikosteroidom. Enkrat do dvakrat na dan.

Katera posebna opozorila in previdnostne ukrepe je potrebno upoštevati pri uporabi DEXYANE MeD kreme?

Ne uporabljajte, če ste alergični na katerokoli sestavino. V primeru alergijske reakcije se posvetujte z zdravnikom.

Preprečite stik z očmi, da preprečite draženje. Če pride krema v stik z očmi, takoj sperite s čisto vodo. Če razdraženost očesa ne izgine, se posvetujte z zdravnikom.

Zaradi pomanjkanja razpoložljivih podatkov, ne uporabljajte, če ste noseči ali če dojite.

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Ne nanašajte na kožo dojenčka pod plenico, ne nanašajte na sluznice.

Ne nanašajte na več kot 30 % površine kože.

Po uporabi tubo dobro zaprite.









V primeru kakršnihkoli neželenih dogodkov zaradi uporabe kreme se posvetujte z zdravnikom.

Če domnevale, da je zaradi uporabe tega izdelka prišlo do resnih neželenih dogodkov, o tem obvestite pristojni nacionalni organ in proizvajalca.

Tuba 30 in 100 ml

Navodilo za uporabo je bilo zadnjič revidirano oktobra 02/ 2021.

Medicinski pripomoček nosi oznako CE od leta 2016

	Datum izteka roka uporabnosti
	Številka serije
	Preberite navodilo za uporabo
	Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
	Proizvajalec
	Rok uporabnosti po odprtju
	Datum proizvodnje
 25 °C	Hraniti na temperaturi < 25 °C



PIERRE FABRE MEDICAL DEVICES

29, avenue du Sidobre - 81106 Castres Cedex - France

CE 0459




Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique

Laboratoires Dermatologiques Ducray
Les Cauquillous - 81500 Lavaur - France